

研究课题	$\alpha$ -1b 干扰素利多卡因压缩雾化吸入治疗小儿疱疹性咽峡炎疗效观察												
研究作者	但东红												
研究单位	重庆市西郊医院儿科												
研究目的	评价运德素、利多卡因雾化吸入治疗小儿疱疹性咽峡炎的疗效。												
研究方法	随机对照研究												
研究病例	运德素组：112 例      对照组：80 例												
治疗方法	运德素组：运德素 5~7 万 U/(kg·次) + 利多卡因，雾化吸入，1 次/d，疗程 4d； 对照组：利巴韦林肌注或口服，疗程 4d。												
疗效评价指标	(1) 显效：治疗 48 小时内体温恢复正常，食欲好转，咽峡疱疹缩小，无溃疡形成； (2) 有效：治疗 72 小时内体温恢复正常，咽峡疱疹缩小并逐渐消失，无溃疡形成； (3) 无效：治疗 96 小时以上，体温仍不能恢复正常，疱疹不愈，形成溃疡。												
研究结果	<p>一、基线特征：入院时两组患儿一般资料比较差异无统计学意义，具有可比性。</p> <p>二、临床疗效：运德素组总有效率为 90.2%，明显高于对照组 72.5% (<math>P&lt;0.01</math>)，见图 1。</p> <p>三、不良反应：</p> <p>运德素组：无明显不良反应；</p> <p>对照组：4 例白细胞下降，7 例中性粒细胞下降，3 例腹泻。</p> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <caption>图1. 临床疗效比较</caption> <thead> <tr> <th>组别</th> <th>显效 (%)</th> <th>有效 (%)</th> <th>无效 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>运德素组</td> <td>53</td> <td>37</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>对照组</td> <td>35</td> <td>37</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> </div>	组别	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	运德素组	53	37	10	对照组	35	37	28
组别	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)										
运德素组	53	37	10										
对照组	35	37	28										

结论	运德素雾化吸入治疗疱疹性咽峡炎，可显著提高疗效，无不良反应发生，安全性良好。
期刊-年-卷 期-页	现代医药卫生，2008 年第 24 卷第 4 期：519