

研究课题	干扰素治疗流行性腮腺炎 98 例疗效观察
研究作者	张宏斌, 王雪平
研究单位	沈阳市传染病院传染门诊, 沈阳市第四人民医院内科
研究目的	观察运德素治疗流行性腮腺炎的疗效
研究方法	随机对照试验
研究病例	运德素组: 60 例 ;                      对照组: 38 例。
治疗方法	运德素组: 常规(对症治疗) + 运德素 10 $\mu$ g, 1 次/d, 疗程 3-5d; 对照组: 常规(对症治疗) + 病毒唑肌注或静滴, 疗程 3-7d。
疗效评价指标	疗效判定标准: (1) 显效: 经治疗 72h 体温降至正常, 腮腺肿胀消退; (2) 有效: 经治疗 72h 体温降至正常, 腮腺肿胀逐渐消退; (3) 无效: 经治疗 72h 体温未降至正常, 腮腺肿胀消退不明显。
统计方法	应用 SPSS13.0 软件进行分析, 行 $X^2$ 检验
结果	一、临床疗效: 运德素组组显效 35 例(58.3%), 有效 20 例(33.3%), 无效 5 例(8.3%), 总有效率 91.7%。对照组显效 13 例(34.2%), 有效 15 例(39.5%), 无效 10 例(26.3%), 总有效率 73.7%。运德素组总有效率明显优于对照组 ( $P<0.05$ ), 见图 1。 二、不良反应: 运德素组未见明显副作用




图1. 临床治疗疗效比较

结论

应用运德素治疗流行性腮腺炎，显著提高总有效率，疗效优于病毒唑。

期刊-年-卷  
期-页

中国中西医结合儿科学 2009 年第 1 卷第 2 期：182-183